

अकोले ते श्रीरामपूर परिसरात दोनशे बिबट्यांचा वावर तीन वर्षांच्या पाहणीतील निष्कर्ष

अकोले (प्रतिनिधी):- तालुक्यातील हंभोडीपासून श्रीरामपूर पर्यंतच्या उस क्षेत्र असलेल्या प्रवरा पट्ट्यात २०० बिबटे असल्याचा अंदाज बिबट्याच्या प्रश्नाच्या अभ्यासक विद्या अत्रेया यांनी व्यक्त केला आहे. बिबट्यांना पकडून दुसरीकडे सोडून त्यांच्या प्रचलीत पद्धतीने बिबट्यांचा हा प्रश्न सुटणार नाही.

बंगलोरच्या इंडियन इन्स्टिटयुट ऑफ सायन्सच्या सहकार्यानि सन २००७ पासून बिबट्यांच्या प्रश्ना संदर्भात अकोले तालुक्यात श्रीमती अत्रेया यांनी काम सुरु केले. पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर येथील २ वर्षात बिबट्यांने ५० लोकांवर हल्ले केले तेव्हा पासून आपण वनजीव्य

प्राण्याविषयी अभ्यास सुरु केला. तालुक्यातील हंभोडी ते संगमनेर तालुक्यातील धांदरफळ या ३०० चौ. कि. अंतरावर उस क्षेत्रात

१२ बिबटे कॅमेरेंत आढळून आले. त्यामध्ये ४ बछड्यांचा समावेश आहे. हंभोडी ते श्रीरामपूर या भागात २०० असून प्रवरा परिसरात काही ठिकाणी बिबट्याची विष्ठा आढळून येते. अकोल्यात ३ हजार डूकरे व २०० कुत्रे असल्याचा सर्व करण्यात आला आहे. बिबट्यांने काही



डूकरांवर मारलेला ताव हे ही आढळून आले तर बिबट्यांने जनावरावर केलेल्या हल्ल्याची रक्कम संबंधीत खात्याकडून ३ वर्ष मिळत नाही. संबंधीत विभागाने हि रक्कम नुकसानगस्त

शेतकऱ्यांना आदा करावी. तसेच शेतकऱ्यांना जनावरांना शेड बांधण्यासाठी सबसिडी मिळावी या संदर्भात तालुक्यातील लोक प्रतिनिधीची भेट घेवून त्यांना बिबट्यांच्या हल्ल्यात मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत मिळावी. शासन दरबारी प्रयत्न करावे असे सांगितले.

बिबट्या नर जातीचा असेल तर त्याचे वजन ६० किलो तर मादी ४० किलो वजनाची असते. बिबट्या एकदा जेरबंद केला तर दुसरा येतच राहिल. बिबट्यांचा संघर्ष सुरुच राहणार आहे. बिबट्या स्वतःहून दुसऱ्यावर चाल करत नाही. मात्र त्यास धोका जाणवल्यास तो इतरांवर हल्ला करतो. मोकाट जनावरे कमी करणे, गाव स्वच्छ करणे ही कामे बिबट्यांच्या नियंत्रणासाठी करावी लागणार आहे. अकोले परिसरात झालेल्या सर्वक्षेणात बिबट्यांबरोबरच ९० तरस, लांडगे, दोन रानमांजरे त्यांना आढळले. बिबट्या एका रात्री १० ते १५ किलोमीटर प्रवास करतो. त्यांचे ज्वलंत उदाहरण रेडे येथील बिबट्या कॅमेरेंत बंदीस्त झालेला. दुसऱ्या दिवशी आंबडच्या शिवारात

आढळून आला. अकोले शिवारात ७ बिबटे शहराच्या मध्यवस्तीतून जात असल्याचे कॅमेऱ्यातून आढळून आले. बिबट्यांच्या शोध मोहिमेसाठी भूलतज्ज्ञामार्फत त्यांना त्याला भूलीचे इंजेक्शन देऊन बिबट्यांच्या गळ्यात कॉलरआयडी बसविण्यात येतो. त्यानंतर त्याचा वावर किती किलोमीटरच्या परिसरात होतो. याची उपग्रहाद्वारे माहिती घेण्यात येते. जुन्नर येथे सोडण्यात आलेला बिबट्या १०० किलोमीटर अंतर पार करून पुन्हा कुंभेफळच्या शिवारात कॉलरआयडीमुळे निदर्शनास आला.

बिबट्यांच्या खाद्यामध्ये ६० टक्के वाटा डूकर व ३९ टक्के वाटा कुत्रे व शेळ्यांमध्यांचा आहे.

मुंगूस, उदमांजर, घुस या सारखी जंगली जनावरांचे त्यांच्या आहारातील प्रमाण अवघ्ये १ टक्का असल्याचे आढळून आले. बिबट्यांनी मारलेले भक्ष तरस पळवितात. तरसापासून आपल्या खाद्याचा बचाव करण्यासाठी त्याने मारलेले जनावर झाडावर नेऊन ठेवल्याचे कॅमेरेंत आढळून आले. त्याने भक्ष केलेल्या मृत जनावर जमिनीत पुरले तरी बिबट्याचा वावर त्या ठिकाणी पुन्हा होतो. तो जनावराचे मांस देखील खातो. हे कळस येथील एका शेतकऱ्याच्या मेलेल्या वासराच्या ठिकाणी पथक कॅमेरे लावून शोधून काढले. जंगलाबाहेर उस क्षेत्रातील बिबट्यांचे अस्तित्व पूर्णपणे नष्ट करता येणार नाही.